Continue

Nombres comerciales: Plidan compuesto. Nombre genérico: Pargeverina + Clonixinato de lisina. Sirve para: Espasmos intestinales / Cólico. Plidan compuesto es un medicamento combinado, cuyos principales componentes son Pargeverina y Clonixinato de lisina, dos sustancias que en conjunto tienen la capacidad de calmar el dolor y reducir los espasmos, por lo que resulta beneficioso para tratar para enfermedades como: Síndrome de intestino irritable: un trastorno intestinal que ocasiona dolor abdominal, gases, diarrea y constipación. Cólico abdominal: dolores abdominales que aumentan de intensidad, por lo general se producen contracciones para luego ir disminuyendo de forma progresiva. Colecistitis: es la inflamación de la vesícula biliar, que origina cólicos que suelen aparecer luego de una comida abundante en grasas, y generalmente se deben la presencia de pequeñas piedras o cálculos dentro de la vesícula. Cólicos renales y ureterales: también conocido como cólico nefrítico, es un dolor intenso y repentino que se debe con frecuencia a cálculos en el conducto que va desde los riñones hasta la uretra. Los beneficios de Plidan compuesto se deben a que a diferencia de Plidan solo combina la acción de dos fármacos, por un lado la Pargeverina tiene la capacidad de reducir los espasmos de estos órganos, mientras que el Clonixinato de lisina alivia el dolor sin alterar el estado de conciencia o la coagulación como lo hacen otros analgésicos, por lo que aporta un alivio eficiente con muy pocos efectos adversos. Presentaciones y forma de administración Comprimidos con 125 mg de Clonixinato de lisina y 10 mg de Pergevarina, en caja con 20 unidades elaborado por laboratorios Weser pharma. Dosis y usos recomendados por edad Presentación Niños Adultos Veces al día Comprimidos 1 a 2 1 a 2 3 ** USO Y DOSIS DEBE SER SIEMPRE RECETADA POR UN MÉDICO ** Medicamento en niños: el uso de Plidan compuesto solo esta permitidos en niños mayores de 10 años, por lo que no se recomienda su uso en niños menores a esta edad. Para iniciar el tratamiento se recomienda consumir 1 ó 2 comprimidos tres veces al día, acompañada de un vaso de agua independientemente de la comidas. Asimismo es importante evite triturar o masticar los comprimidos, ya que de esta forma se reduce su absorción en el organismo. Generales. No se debe utilizar Plidan compuesto en pacientes con glaucoma, hipertrofia de próstata o estenosis pilórica. Alergias o hipersensibilidad. Este medicamento no debe ser consumido por aquellas personas que hayan presentado alergias a Pargeverina, el Clonixinato de lisina o a otros fármacos de composición similar. Mezcla con alcohol. No se han realizado estudios que avalen o prohíban el consumo de alcohol durante el tratamiento. Mezclar con otros medicamentos. Se debe tener precaución especial al ser usado por personas que están siendo tratadas con medicamentos como la Levopromazina, Sertralina o Verapamilo, ya que pueden potenciar sus efectos. Combinación de Plidan compuesto en embarazo y lactancia EMBARAZO MEDIO LACTANCIA MEDIO RIESGO MEDIO El uso de Plidan compuesto no es compatible durante el embarazo, ya que, aunque los estudios realizados en animales no se han relacionado con efectos adversos para la madre o el feto, hasta la fecha no se han realizado suficientes estudios en humanos que aprueben el uso del Pargeverina y Clonixinato de lisina por lo que no se recomienda durante los primeros tres meses de embarazo. El uso de Plidan compuesto no es compatible con la lactancia. Porque investigaciones presentadas por e– lactancia indican que hasta la fecha se desconoce si Pargeverina o el Clonixinato de lisina pueden ser excretados en la leche materna, y aunque esto resulta poco probable, se recomienda utilizar otras alternativas más seguras durante este periodo. Efectos secundarios En general el Plidan compuesto suele ser bien tolerado por la mayoría de los pacientes, sin embargo, ha sido posible encontrar efectos adversos, los cuales pueden afectar a menos de 1 de cada 100 personas, entre estos se encuentran: Sistema nervioso central: mareo y somnolencia. Digestivo, náusea, constipación. Otros: sequedad de boca. Es importante que ante a la aparición de alguno de estos síntomas visite a su médico de forma inmediata. Fuentes médicas El Plidan, un medicamento versátil y de acción rápida, se ha consolidado como un eficaz alivio para diversos trastornos relacionados con espasmos y cólicos en sistemas como el gastrointestinal, urinario y reproductivo femenino. Compuesto principalmente por pargeverina y a menudo enriquecido con clonixinato de lisina, su administración varía según la sintomatología. Sin embargo, su uso implica precauciones y contraindicaciones, como efectos secundarios y posibles interacciones medicamentosas, por lo que se recomienda una consulta médica previa para un tratamiento integral. ¿Para qué sirve el Plidán y cómo se usa? El Plidán se usa para tratar diversos trastornos que afectan al sistema gastrointestinal, al sistema urinario o al sistema reproductor femenino. Estos trastornos se caracterizan por la presencia de espasmos o cólicos, que son dolores intensos causados por la contracción anormal de los músculos lisos. Algunos ejemplos de estos trastornos son: Síndrome de intestino irritable: es una alteración funcional del intestino que provoca dolor abdominal, diarrea o estreñimiento, gases y distensión abdominal. Se desconoce su causa exacta, pero puede estar relacionado con factores psicológicos, alimentarios o infecciosos. Colopatías: son inflamaciones del colon o del recto que pueden tener diversas causas, como infecciones, enfermedades autoinmunes o tumores. Se manifiestan con dolor abdominal, sangrado rectal, diarrea o estreñimiento. Cólicos renales: son dolores agudos en la zona lumbar o en el abdomen inferior causados por la obstrucción del paso de la orina debido a la presencia de cálculos o piedras en los riñones o en las vías urinarias. Se acompañan de náuseas, vómitos, fiebre y dificultad para orinar. Cólicos biliares: son dolores intensos en la zona superior derecha del abdomen causados por la obstrucción del flujo de la bilis debido a la presencia de cálculos o piedras en la vesícula biliar o en el conducto biliar. Se acompañan de náuseas, vómitos, fiebre y coloración amarillenta de la piel y los ojos (ictericia). Cólicos menstruales: son dolores en la zona pélvica o en la parte baja del abdomen que se producen antes o durante la menstruación debido a la contracción del útero para expulsar el tejido endometrial. Se acompañan de otros síntomas como sangrado abundante, náuseas, vómitos, diarrea o dolor de cabeza. Dispepsia: es una sensación de malestar o indigestión que se produce después de comer o beber. Puede deberse a una gastritis, una úlcera, una hernia de hiato o un reflujo gastroesofágico. Se manifiesta con dolor o ardor en el estómago, sensación de plenitud, eructos, gases o náuseas. Aspecto Plidán Común Plidán Compuesto Plidán en Ampolletas Indicación Médica Según médico o farmacéutico Según médico o farmacéutico Según médico o farmacéutico Componente Principal Pargeverina Pargeverina + Clonixinato de lisina Pargeverina Forma de Administración Grageas o gotas Comprimido Inyección intramuscular Dosis Habitual 10-20 mg cada 6-8 hrs 1 comprimido cada 8 hrs 1 inyección cada 8 hrs Frecuencia Cada 6 u 8 horas Cada 8 horas Cada 8 horas ¿Qué es el Plidán y cuál es su composición? El Plidán es un medicamento comercial que se vende en forma de grageas, gotas o ampolletas. Su principio activo es la pargeverina, una sustancia química que pertenece al grupo de las aminas terciarias. La pargeverina actúa sobre las fibras musculares lisas, que son las que forman parte de los órganos internos, y las relaja mediante un mecanismo llamado bloqueo de los canales de calcio. De esta forma, se evita que los músculos se contraigan demasiado y se produzcan los espasmos. Además de la pargeverina, el Plidan puede contener otros componentes, como el clonixinato de lisina, que es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) que también tiene efecto analgésico. El clonixinato de lisina se añade al Plidan para potenciar su acción y reducir la inflamación que puede acompañar a los espasmos. Precauciones: No todo lo que brilla es oro Efectos secundarios comunes Como todo medicamento, el Plidán puede tener efectos secundarios en algunas personas. Estos efectos son generalmente leves y transitorios, y desaparecen al suspender el tratamiento. Algunos de los efectos secundarios más frecuentes son: Somnolencia: es una sensación de sueño o cansancio que puede afectar al rendimiento físico o mental. Se recomienda no conducir ni manejar maquinaria peligrosa mientras se toma el Plidán. Sequedad bucal: es una disminución de la producción de saliva que puede provocar dificultad para tragar, hablar o masticar. Se recomienda beber abundante agua y evitar el consumo de alcohol o tabaco. Visión borrosa: es una pérdida de nitidez o claridad en la visión que puede dificultar la lectura o el reconocimiento de objetos. Se recomienda no usar lentes de contacto ni forzar la vista mientras se toma el Plidán. Hipotensión: es una disminución de la presión arterial que puede provocar mareos, vértigos o desmayos al cambiar de posición o al levantarse. Se recomienda levantarse lentamente y evitar los cambios bruscos de temperatura. Taquicardia: es un aumento de la frecuencia cardíaca que puede provocar palpitaciones, nerviosismo o ansiedad. Se recomienda evitar el estrés y las bebidas estimulantes como el café o el té. Náuseas: son unas ganas de vomitar que pueden estar acompañadas de malestar estomacal. Se recomienda comer poco y a menudo, evitar las comidas grasas o picantes y tomar infusiones digestivas. Estreñimiento: es una dificultad para evacuar las heces que puede provocar dolor abdominal, hinchazón o hemorroides. Se recomienda aumentar el consumo de fibra, agua y ejercicio físico. Estos efectos secundarios no afectan a todas las personas por igual, y pueden variar según la sensibilidad individual, la dosis y la duración del tratamiento. Si se presentan estos u otros efectos secundarios graves o persistentes, se debe suspender el uso del Plidán y consultar al médico lo antes posible. Contraindicaciones El Plidán también tiene algunas contraindicaciones, es decir, situaciones en las que no se debe tomar este medicamento por el riesgo de sufrir reacciones adversas graves. Algunas de estas contraindicaciones son: Alergia: si se tiene alergia a la pargeverina, al clonixinato de lisina o a cualquier otro componente del Plidán, se puede sufrir una reacción alérgica que se manifiesta con erupción cutánea, picor, hinchazón, dificultad para respirar o shock anafiláctico. Se debe evitar el uso del Plidan y buscar atención médica de urgencia si se presenta alguno de estos síntomas. Embarazo y lactancia: si se está embarazada o lactando, se debe consultar al médico antes de tomar el Plidán, ya que puede afectar al desarrollo del feto o pasar a la leche materna y causar efectos adversos en el bebé. Se debe usar el Plidan solo bajo prescripción médica y con precaución. Enfermedades hepáticas o renales: si se tiene alguna enfermedad que afecte al funcionamiento del hígado o de los riñones, se debe ajustar la dosis del Plidán o evitar su uso, ya que puede acumularse en el organismo y provocar toxicidad. Se debe informar al médico de cualquier problema hepático o renal antes de tomar el Plidan. Enfermedades cardíacas: si se tiene alguna enfermedad que afecte al ritmo o a la presión del corazón, como arritmias, angina de pecho o hipertensión arterial, se debe usar el Plidán con precaución y bajo control médico, ya que puede alterar el funcionamiento cardíaco y aumentar el riesgo de complicaciones. Interacciones medicamentosas: si se está tomando algún otro medicamento, se debe consultar al médico o al farmacéutico antes de usar el Plidán, ya que puede interactuar con otros fármacos y modificar sus efectos. Algunos de los medicamentos que pueden interactuar con el Plidán son los anticoagulantes, los antihipertensivos, los antidepresivos, los anticonvulsivantes o los antihistamínicos. Estas contraindicaciones no son exhaustivas y pueden variar según el caso individual. Por eso, se recomienda leer el prospecto del Plidán y seguir las indicaciones del médico o del farmacéutico antes de tomar este medicamento. Por qué elegir Plidán: La excelencia en una píldora Amplio Espectro: Trata múltiples trastornos. Acción Rápida: Efecto en 15 minutos vía oral. Durabilidad: Efecto que perdura entre 6 y 12 horas. Tolerabilidad: Pocos efectos secundarios. Accesibilidad: Disponible sin receta médica en muchos países. De la consulta médica al alivio palpable, el Plidán se erige como un fiel aliado contra el tormento de los espasmos y cólicos. Pero, como cualquier fármaco con múltiples aplicaciones, la prudencia en su administración es esencial. Las precauciones y contraindicaciones deben ser evaluadas rigurosamente para evitar efectos secundarios indeseados. La consulta médica previa no es una recomendación casual, sino un imperativo para asegurar un tratamiento seguro y efectivo. En el mundo de los antiespasmódicos, el Plidán brilla, pero solo en manos responsables encuentra su verdadero potencial. Nombres comerciales: Plidan compuesto. Nombre genérico: Pargeverina + Clonixinato de lisina. Sirve para: Espasmos intestinales / Cólico. Plidan compuesto es un medicamento combinado, cuyos principales componentes son Pargeverina y Clonixinato de lisina, dos sustancias que en conjunto tienen la capacidad de calmar el dolor y reducir los espasmos, por lo que resulta beneficioso para tratar para enfermedades como: Síndrome de intestino irritable: un trastorno intestinal que ocasiona dolor abdominal, gases, diarrea y constipación. Cólico abdominal: dolores abdominales que aumentan de intensidad, por lo general se producen contracciones para luego ir disminuyendo de forma progresiva. Colecistitis: es la inflamación de la vesícula biliar, que origina cólicos que suelen aparecer luego de una comida abundante en grasas, y generalmente se deben la presencia de pequeñas piedras o cálculos dentro de la vesícula. Cólicos renales y ureterales: también conocido como cólico nefrítico, es un dolor intenso y repentino que se debe con frecuencia a cálculos en el conducto que va desde los riñones hasta la uretra. Los beneficios de Plidan compuesto se deben a que a diferencia de Plidan solo combina la acción de dos fármacos, por un lado la Pargeverina tiene la capacidad de reducir los espasmos de estos órganos, mientras que el Clonixinato de lisina alivia el dolor sin alterar el estado de conciencia o la coagulación como lo hacen otros analgésicos, por lo que aporta un alivio eficiente con muy pocos efectos adversos. Presentaciones y forma de administración Comprimidos con 125 mg de Clonixinato de lisina y 10 mg de Pergevarina, en caja con 20 unidades elaborado por laboratorios Weser pharma. Dosis y usos recomendados por edad Presentación Niños Adultos Veces al día Comprimidos 1 a 2 1 a 2 3 ** USO Y DOSIS DEBE SER SIEMPRE RECETADA POR UN MÉDICO ** Medicamento en niños: el uso de Plidan compuesto solo esta permitidos en niños mayores de 10 años, por lo que no se recomienda su uso en niños menores a esta edad. Para iniciar el tratamiento se recomienda consumir 1 ó 2 comprimidos tres veces al día, acompañada de un vaso de agua independientemente de la comidas. Asimismo es importante evite triturar o masticar los comprimidos, ya que de esta forma se reduce su absorción en el organismo. Generales. No se debe utilizar Plidan compuesto en pacientes con glaucoma, hipertrofia de próstata o estenosis pilórica. Alergias o hipersensibilidad. Este medicamento no debe ser consumido por aquellas personas que hayan presentado alergias a Pargeverina, el Clonixinato de lisina o a otros fármacos de composición similar. Mezcla con alcohol. No se han realizado estudios que avalen o prohíban el consumo de alcohol durante el tratamiento. Mezclar con otros medicamentos. Se debe tener precaución especial al ser usado por personas que están siendo tratadas con medicamentos como la Levopromazina, Sertralina o Verapamilo, ya que pueden potenciar sus efectos. Combinación de Plidan compuesto en embarazo y lactancia EMBARAZO MEDIO LACTANCIA MEDIO RIESGO MEDIO El uso de Plidan compuesto no es compatible durante el embarazo, ya que, aunque los estudios realizados en animales no se han relacionado con efectos adversos para la madre o el feto, hasta la fecha no se han realizado suficientes estudios en humanos que aprueben el uso del Pargeverina y Clonixinato de lisina por lo que no se recomienda durante los primeros tres meses de embarazo. El uso de Plidan compuesto no es compatible con la lactancia. Porque investigaciones presentadas por e– lactancia indican que hasta la fecha se desconoce si Pargeverina o el Clonixinato de lisina pueden ser excretados en la leche materna, y aunque esto resulta poco probable, se recomienda utilizar otras alternativas más seguras durante este periodo. Efectos secundarios En general el Plidan compuesto suele ser bien tolerado por la mayoría de los pacientes, sin embargo, ha sido posible encontrar efectos adversos, los cuales pueden afectar a menos de 1 de cada 100 personas, entre estos se encuentran: Sistema nervioso central: mareo y somnolencia. Digestivo, náusea, constipación. Otros: sequedad de boca. Es importante que ante a la aparición de alguno de estos síntomas visite a su médico de forma inmediata. Fuentes médicas Nombres comerciales: Plidan compuesto. Nombre genérico: Pargeverina + Clonixinato de lisina. Sirve para: Espasmos intestinales / Cólico. Plidan compuesto es un medicamento combinado, cuyos principales componentes son Pargeverina y Clonixinato de lisina, dos sustancias que en conjunto tienen la capacidad de calmar el dolor y reducir los espasmos, por lo que resulta beneficioso para tratar para enfermedades como: Síndrome de intestino irritable: un trastorno intestinal que ocasiona dolor abdominal, gases, diarrea y constipación. Cólico abdominal: dolores abdominales que aumentan de intensidad, por lo general se producen contracciones para luego ir disminuyendo de forma progresiva. Colecistitis: es la inflamación de la vesícula biliar, que origina cólicos que suelen aparecer luego de una comida abundante en grasas, y generalmente se deben la presencia de pequeñas piedras o cálculos dentro de la vesícula. Cólicos renales y ureterales: también conocido como cólico nefrítico, es un dolor intenso y repentino que se debe con frecuencia a cálculos en el conducto que va desde los riñones hasta la uretra. Los beneficios de Plidan compuesto se deben a que a diferencia de Plidan solo combina la acción de dos fármacos, por un lado la Pargeverina tiene la capacidad de reducir los espasmos de estos órganos, mientras que el Clonixinato de lisina alivia el dolor sin alterar el estado de conciencia o la coagulación como lo hacen otros analgésicos, por lo que aporta un alivio eficiente con muy pocos efectos adversos. Presentaciones y forma de administración Comprimidos con 125 mg de Clonixinato de lisina y 10 mg de Pergevarina, en caja con 20 unidades elaborado por laboratorios Weser pharma. Dosis y usos recomendados por edad Presentación Niños Adultos Veces al día Comprimidos 1 a 2 1 a 2 3 ** USO Y DOSIS DEBE SER SIEMPRE RECETADA POR UN MÉDICO ** Medicamento en niños: el uso de Plidan compuesto solo esta permitidos en niños mayores de 10 años, por lo que no se recomienda su uso en niños menores a esta edad. Para iniciar el tratamiento se recomienda consumir 1 ó 2 comprimidos tres veces al día, acompañada de un vaso de agua independientemente de la comidas. Asimismo es importante evite triturar o masticar los comprimidos, ya que de esta forma se reduce su absorción en el organismo. Generales. No se debe utilizar Plidan compuesto en pacientes con glaucoma, hipertrofia de próstata o estenosis pilórica. Alergias o hipersensibilidad. Este medicamento no debe ser consumido por aquellas personas que hayan presentado alergias a Pargeverina, el Clonixinato de lisina o a otros fármacos de composición similar. Mezcla con alcohol. No se han realizado estudios que avalen o prohíban el consumo de alcohol durante el tratamiento. Mezclar con otros medicamentos. Se debe tener precaución especial al ser usado por personas que están siendo tratadas con medicamentos como la Levopromazina, Sertralina o Verapamilo, ya que pueden potenciar sus efectos. Combinación de Plidan compuesto en embarazo y lactancia EMBARAZO MEDIO LACTANCIA MEDIO RIESGO MEDIO El uso de Plidan compuesto no es compatible durante el embarazo, ya que, aunque los estudios realizados en animales no se han relacionado con efectos adversos para la madre o el feto, hasta la fecha no se han realizado suficientes estudios en humanos que aprueben el uso del Pargeverina y Clonixinato de lisina por lo que no se recomienda durante los primeros tres meses de embarazo. El uso de Plidan compuesto no es compatible con la lactancia. Porque investigaciones presentadas por e– lactancia indican que hasta la fecha se desconoce si Pargeverina o el Clonixinato de lisina pueden ser excretados en la leche materna, y aunque esto resulta poco probable, se recomienda utilizar otras alternativas más seguras durante este periodo. Efectos secundarios En general el Plidan compuesto suele ser bien tolerado por la mayoría de los pacientes, sin embargo, ha sido posible encontrar efectos adversos, los cuales pueden afectar a menos de 1 de cada 100 personas, entre estos se encuentran: Sistema nervioso central: mareo y somnolencia. Digestivo, náusea, constipación. Otros: sequedad de boca. Es importante que ante a la aparición de alguno de estos síntomas visite a su médico de forma inmediata. Fuentes médicas Denominación genérica: Clorhidrato de Pargeverina + Clonixinato de Lisina.Forma farmacéutica y formulación: Grageas: Clorhidrato de Pargeverina 10 mg. Clonixinato de Lisina 125 mg. Excipiente cbp 1 gragea. Presentación Dual: Ampolleta I. Clorhidrato de Pargeverina 15 mg. Vehículo cpb 2ml. Ampolleta II. Clonixinato de Lisina 100 mg. Vehículo cbp 2 ml.Indicaciones terapéuticas: Antiespasmódico-analgésico en afecciones del aparato digestivo como: Síndrome Espástico doloroso. Esofágico, Gástrico, Pilórico y Colitis. Afecciones de las vías biliares: Colitis hepática. Colecistitis, Síndrome postcolecistectomía. En Urología ha demostrado su efectividad en cólicos renales y uretrales. Cistitis y Cistopiellitis. Litasis renal o uretral.Farmacocinética y farmacodinamia: El Clorhidrato de Pargeverina es un fármaco que se absorbe rápidamente cuando se administra tanto por vía oral como parenteral. Se matboliza en el organismo sin que sus metabolitos hayan sido identificados, mismo que se excretan a través de la bilis y de la orina. El proceso de eliminación es relativamente rápido, de manera que es necesaria la administración de dosis repetidas cada 8 horas. El efecto antiespasmódico del Clorhidrato de Pargeverina deriva de su acción antimuscarínica y musculotrópica. Por su acción sobre la miofibrilla contracturada o distendida, la Pargeverina, ejerce efecto espasmólítico y es de utilidad en el tratamiento de todos los síndromes viscerales dolorosos cuyo principal componente es el espasmo de la musculatura lisa localizado en cualquier porción del tracto digestivo de las vías biliares, del tracto urinario o del aparato genital femenino. El Clonixinato de Lisina, es un analgésico no narcótico, derivado del ácido antranílico. Inhibe la enzima prostaglandina sistetasa, responsable de la síntesis de prostaglandinas. Las prostaglandinas PGE y PGF2 son responsables directas de la estimulación de los neurorreceptores del dolor; Clonixinato de Lisina, al bloquear su producción, evita la captación de la sensibilidad dolorosa, independiente de la causa, intensidad o localización. También se ha demostrado que el Clonixinato de Lisina inhibe a la bradicina y PGF2 ya producidas por lo que se considera como un antagonista directo de los mediadores del dolor. El Clonixinato de Lisina cuenta con un efecto analgésico, sin alterar las constantes vitales ni el estado de conciencia de los pacientes, ya que es un analgésico no narcótico. Dosis de 125 mg de Clonixinato de Lisina es 23.6 veces mayor que el ácido acetilsalicílico y 10 veces mayor comparada con la Dipirona. No deprime la médula ósea ni interfiere con los factores de coagulación, por lo que no altera el tiempo de sangrado. El Clonixinato de Lisina se absorbe rápida y totalmente en el estómago, iniciando su actividad dentro de los primeros 10 a 15 minutos después de ingerida, alcanzando concentraciones séricas máximas a la hora de su administración. No se deposita en la mucosa gástrica por ello tiene un mínimo índice úlcero génico. Se distribuye ampliamente en todos los tejidos. Es metabolizado parcialmente a nivel hepático y se elimina por vía urinaria. En aquellos casos en los que el diagnóstico diferencial entre el dolor visceral y dolor somático es impreciso o cuando ambos se superponen, PLIDAN COMPUESTO® ejerce efectos antiespasmódico y analgésico normalizando el miotono y la motilidad visceral. PLIDAN COMPUESTO® ejerce efecto analgésico sobre las áreas afectadas y zonas relajadas bloqueando efectivamente el ciclo del espasmo visceral - dolor somático.Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo, glaucoma, hipertrofia prostática y estenosis orgánica de píloro.Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia: Siguiendo normas internacionales no se recomienda su empleo durante los tres primeros meses de embarazo.Reacciones secundarias y adversas: A dosis altas puede producirse somnolencia.Interacciones medicamentosas y de otro género: El tratamiento simultáneo con fenotiazinas, antidepresivos tricíclicos y antiarrítmicos, pueden potencializar el efecto antimuscarínico de PLIDAN COMPUESTO®.Alteraciones en los resultados de pruebas de laboratorio: No han sido reportadas.Precauciones en relación con efectos de carcinogénesis, mutagénesis, teratogénesis y sobre la fertilidad: A través de estudios experimentales se ha demostrado que el Clorhidrato de Pargeverina + Clonixinato de Lisina carece de estos efectos. Siguiendo normas internacionales no se recomienda su empleo durante los tres primeros meses de embarazo.Dosis y vía de administración: Pargeverina + Clonixinato de Lisina Grageas: Adultos y niños mayores de 10 años: 1-2 Grageas 3 veces al día. Ingerir las grageas enteras, sin masticar. Inyectable: 1.- Utilizar una jeringa común de vidrio o plástico, con aguja para inyección intramuscular o intravenosa. 2.- Cargar una ampolleta I y una ampolleta II en la misma jeringa, puede aspirarse indistintamente, primero el contenido de la ampolleta I o el de la ampolleta II. 3.- Aplicar indistintamente por vía intramuscular o intravenosa (lenta), según la indicación médica.Manifestaciones y manejo de la sobredosificación o ingesta accidental: En aso de sobredosificación o ingesta accidental, de acuerdo a la variación individual en la respuesta a los fármacos, puede ocasionar sequedad de boca y garganta, visión borrosa, taquicardia y palpitaciones, somnolencia. Se recomienda vaciamiento a lavado gástrico y/o suspender la administración del medicamento.Presentación(es): Grageas: Caja con 20. Inyectable: Presentación Dual.Recomendaciones sobre almacenamiento: Consérvese en un lugar fresco y seco. Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños.Nombre y domicilio del laboratorio: SIEGFRIED RHEIN, S.A. de C.V. Calle 2 No. 30, Fracc. Ind. Benito Juárez, C.P. 76120, Querétaro, México.Número de registro del medicamento: Grageas 421M95 SSA. Inyectable 417M95 y 325M81 SSA. C 1win регистрация открывает доступ к миру азартных игр. Онлайн-казино гарантирует незабываемые эмоции и крупные выигрыши. Играйте в любимые азартные игры и выигрывайте с помощью pin up. Ваше время настало! Быстрое и рабочее мостбет зеркало обеспечивает надежный доступ к платформе в любое время и без проблем. Portada » ¿Para que sirve el plidan? Las afecciones crónicas y agudas que afectan el tracto digestivo, hepático, urinario y genital con espasmos pueden ser incapacitantes y afectar a quien lo padece. Plidan es un medicamento con efectos espasmolíticos poderosos que alivian estos síntomas por su acción sobre la musculatura lisa. Plidan es un medicamento indicado como espasmolítico para el tratamiento de espasmos dolorosos en el tracto digestivo, urinario, hepático y genital. Se presenta en gotas, pastillas y ¿Para qué sirve? Actúa como un antiespasmódico antagonista moderado y no selectivo de los receptores muscarínicos. Tiene acción directa sobre el músculo liso visceral. Si se administra de manera oral alcanza su mayor concentración a los 60 minutos y empieza a eliminarse en 4 horas. Tiene un efecto espasmolítico directo sobre el musculo liso del trasto gastrointestinal, previene el espasmo visceral, revierte la hipoxia provocada por el espasmo, alivia los espasmos sobre las vías biliares y urogenitales. Presentación Se presenta en gotas, comprimidos recubiertos y solución inyectable. Composición Plidan gotas contiene por cada ml: Pargeverina clorhidrato (propinox clorhidrato): 10 mg. Excipientes. Cada comprimido recubierto de plidan contiene: Pargeverina clorhidrato (propinox clorhidrato): 10 mg. Clonixinato de lisina: 125 mg. Excipiente. Cada ampolla de plidan de tipo I de 2 ml contiene: Pargeverina clorhidrato (propinox clorhidrato): 15 mg. Excipiente c.s. Cada ampolla de plidan tipo II de 2 ml contiene: Clonixinato de lisina: 100 mg. Excipiente c.s. Indicaciones Plidan está indicado para el tratamiento de todos los síndromes viscerales, agudos o crónicos que causan espasmos musculares en el tracto digestivo, sistemas hepatobiliares, genitales femeninos y urinarios. Tienen un efecto espasmolítica realmente potente. Se utiliza para tratar espasmos dolorosos, disquinesias faringoesofágicas, disfagias, cólicos intestinales, gastritis funcionales, duodenitis, espasmos pilóricos, colecistopatías, espasmos del esfínter de Oddi, colecistitis, disquinesias biliares, colopatías, colitis espasmódica, colitis aguda, sigmoiditis, cólicos nefríticos y ureterales, síndrome de constipación por hipermiotono colónico, espasmos ureterales y vesicales, tensión premenstrual, cistitis, espasmo funcional de las trompas, anexitis dolorosa y como un auxiliar en el tratamiento de la dismenorrea. Advertencias Debido al posible efecto anticolinérgicos, sobre todo en pacientes sensibles o a dosis elevadas, debe de utilizarse con precaución en pacientes que tienen predisposición a padecer de obstrucción intestinal o urinaria. Puede incrementar la frecuencia y la conducción cardiaca, debe administrarse con precaución en pacientes con insuficiencia cardiaca, hipertensión arterial, estenosis mitral y cardiopatía isquémica. Pidal puede relajar el esfínter esofágico inferior, esto significa que debe evitarse su consumo a pacientes con reflujo gastroesofágico o hernia hiatal. Los niños son susceptibles a los efectos tóxicos de este tipo de medicamentos. No debe ser administrado a menores de 1 año. En los ancianos se puede presentar una mayor sensibilidad y una mayor incidencia de efectos adversos. Se debe administrar con precaución por el riesgo de padecer glaucoma no diagnosticado. En dosis elevadas puede causar trastornos de la acomodación. Se debe evitar la conducción de vehículos y maquinaria peligrosa. Reacciones adversas En pacientes sensibles o si se administran dosis elevadas puede aparecer sequedad bucal, visión borrosa, constipación, taquicardia y palpitaciones, esto puede aliviarse con un ajuste de la dosis. Efectos raros y en pacientes con factores que le predisponen a padecerlos se puede presentar retención urinaria, cansancio, aumento de la presión intraocular y disminución de la memoria. Contraindicaciones Está contraindicado en casos de hipersensibilidad conocida a la pargeverina, retención urinaria por enfermedades prostáticas, glaucoma, estenosis pilórica orgánica, íleo paralitico, atonía intestinal y colitis ulcerosa. Solo debe administrarse durante el embarazo si los beneficios superan los posibles riesgos. Debe evitarse su consumo durante el primer trimestre del embarazo. No debe ser administrado durante la lactancia porque puede inhibirla. Interacciones con otros medicamentos y alimentos Debe administrarse con precaución en quienes reciben otras drogas anticolinérgicas u otros medicamentos que presentan efectos anticolinérgicos como los antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos, quinidina y fenotiazinas. Pueden reducir su absorción si se administra con antidiarreicos absorbentes y antiácidos. Puede reducir la absorción del ketoconazol y el itraconazol por sus efectos inhibitorios sobre la secreción ácida gástrica. Antagoniza con metoclopramida. Puede causar constipación severa o retención urinaria si se administra con opioides. Si se administra con antimiasténicos puede causar una disminución de la motilidad gastrointestinal. Puede reducir los efectos Los anticolinérgicos pueden reducir los efectos antipsicóticos del haloperidol en esquizofrénicos. Puede causar arritmias cardíacas durante la anestesia con ciclopropano. Tratamiento en caso de sobredosis No existen casos de sobredosis no tratadas. Se supone que los síntomas corresponden a todas las sobredosis con otros anticolinérgicos tales como retención urinaria, rubor cutáneo, sequedad bucal, taquicardia, bloqueo de la motilidad gastrointestinal y trastornos de la visión. Puede presentarse hipertermia, confusión, nauseas, ataxia, alucinaciones y excitación. Dependiendo del tiempo trascurrido luego de la ingesta, y la cantidad de tóxicos ingerido, el médico decidirá la realización de un tratamiento general de rescate, que puede estar compuesto por: Evacuación gástrica y administración de carbón activado. No se recomienda el uso de fisostigmina. Ante una sobredosis se debe acudir inmediatamente al centro médico más cercano. (1) (2) solucion+gotas-mexico-a03aa+m1-mx_1 (3) (4) Plidán es un medicamento antiespasmódico que sirve principalmente para aliviar el dolor ocasionado por espasmos o cólicos en el hígado, píloro, duodeno y otras partes del abdomen. Nombres comerciales: Plidán, Plidán Compuesto. Nombre genérico: Pargeverina sola o con Lisina. Presentaciones y Vía de Administración: Grageas, gotas, ampolletas. Oral e intramuscular. Sus principales usos son para: Espasmos / Cólicos / Colitis / Dispepsia. Sus principales aplicaciones son: Dispepsia o gastritis funcional, padecimiento inflamatorio doloroso del abdomen sin causa o enfermedad aparente. Cólicos: En el hígado o la vesícula biliar. Renales. En la uretra. Espasmos en: Hígado. Píloro. Uretra. Vejiga. Esfínter de Oddi. Trompas de Falopio. Inflamación con o sin dolor de: Hígado. Duodeno. Vejiga urinaria. Vesícula biliar. Ovarios. Trompas de Falopio. Para el dolor provocado por cálculos en riñones, hígado o uretra. Úlceras en el estómago, esófago o intestino delgado. Disquinesias faringo esofágicas, trastornos de los músculos relacionados con la deglución de alimentos y bebidas, como la disfagia, por ejemplo. Colitis o síndrome de colon irritable. Otros padecimientos del colon como la sigmoiditis. Estreñimiento. Síndrome premenstrual, serie de síntomas que anteceden el período menstrual en algunas mujeres. Dismenorrea, como coadyuvante para este padecimiento que consiste en una menstruación difícil y dolorosa. En diversos padecimientos es necesario el diagnóstico mediante análisis clínicos u otros estudios antes de prescribir este medicamento. Una vez prescrito, es indispensable seguir la receta médica al pie de la letra. También se encuentra disponible Plidán Compuesto, cuya fórmula es a base de: Clorhidrato de Pargeverina y Clonixinato de Lisina. Precio Farmacias del Ahorro Farmacia San Pablo Walmart Farmalisto Plidán solución $240 $247 $239 $229 Plidán grageas $261 $296 $269 $249 Plidán tiene un precio promedio de $238 en su presentación en solución, esto se traduce en un precio de $12 por mililitro. Los precios varían entre farmacias, por ejemplo el precio más barato lo tiene Farmalisto con un precio de $229 y el más caro Farmacia San Pablo con un precio de $247. Esto representa un aumento de casi el 10% sobre la misma presentación. Para la presentación en grageas el caso es lo mismo, las mismas farmacias mencionadas anteriormente ofrecen los precios más bajos y altos. El precio varía entre farmacias por la misma presentación, pero para comprar el medicamento más barato busca en las farmacias en línea de Farmalisto, debido a que ofrecen ambas presentaciones al precio más bajo del mercado. **Es importante aclarar que estos precios fueron tomados de la farmacia en línea en una investigación hecha por el equipo de quefarmacia en Enero 2020, los precios pueden modificarse con el tiempo y la sucursal de la farmacia.** Para encontrar el mejor precio compara varias farmacias en nuestra próxima sección. Presentaciones y forma de administración Este medicamento es fabricado por Siegfried Rhein en la marca Plidán en todas las presentaciones. Adicionalmente viene como comprimidos bajo la marca Plidán Compuesto. Grageas, perlas o comprimidos de 10 mg de Clorhidrato de Pargeverina, en cajas de 10 o 20 piezas. Una presentación en comprimidos contiene además 125 mg de Clonixinato de Lisina. Gotas de 10 mg por ml, como Clorhidrato de Pargeverina, en frascos con gotero conteniendo 20 ml. Solución inyectable de 10 mg por ml de Clorhidrato de Pargeverina, en cajas con 3 ampolletas de 1 ml. Dosis y Usos Recomendados Por Edad Presentación 0 a 10 años Adultos Veces al día Grageas, perlas o comprimidos No 1 – 2 3 Gotas 2 a 20 gotas No 3 – 4 Solución inyectable No 10 mg 3 *Uso y dosis debe ser siempre recetada por un médico* Medicamento en niños: La dosis infantil es de 2 a 4 gotas para los menores de 2 años. A partir de dicha edad se calcula a 2 gotas por cada año de edad hasta los 10 años. Desde los 11 se considera el uso como adultos. La solución inyectable puede aplicarse por vía muscular o intravenosa. Las grageas, perlas o comprimidos no deben masticarse, sino que deben tragarse completas con la ayuda de medio vaso de agua, para que puedan llegar al punto de absorción. Generales. No se recomienda usar en personas con glaucoma, problemas con la próstata o estenosis orgánica del píloro, un aumento en el grosor de los músculos que dificulta o impide el vaciado del estómago a los intestinos. Expertos recomiendan evitar su uso en presencia de hemorragias o úlceras gástricas. Alergias o hipersensibilidad. No se use en personas alérgicas al medicamento. Mezcla con Alcohol. El consumo de alcohol al estar en tratamiento con este medicamento aumenta el riesgo de padecer los efectos secundarios relacionados con el sistema nervioso central. Mezclar con otros medicamentos. Debe evitarse su uso con medicamentos antidepresivos tricíclicos, antiarrítmicos y fenotiazinas